IMPLANTES CÔNICOS E IMPLANTES CILÍNDRICOS – BREVE REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Palavras-chave: Implantes cónicos; Implantes cilíndricos; Macrogeometria.

Introdução

A inclusão dos implantes na área da reabilitação oral estabeleceu novos conceitos de planeamento protético na Medicina Dentária, proporcionando ao paciente uma opção mais aproximada à estrutura dentária original e, naturalmente, uma melhor função mastigatória e estética.

Consequência dos resultados obtidos por Brånemark, vários estudos surgiram e muitos modelos de implantes foram desenvolvidos, com distintas formas e superfícies no sentido de se atingir o sucesso do tratamento, tornando os implantes dentários uma opção com resultados previsíveis.

Com o objetivo de melhorar esses mesmos resultados, principalmente em casos de pior prognóstico – pouca densidade óssea, por exemplo – ou de simplificar técnicas cirúrgicas como a da carga imediata, surgiram nas últimas décadas inúmeras modificações no desenho ou macrogeometria dos implantes.^{1,2}

A macrogeometria está relacionada com a estrutura tridimensional do implante, isto é, a forma, superfície, configuração e macroirregularidades do mesmo.^{2,3} Segundo Martínez-González *et al.* (2002)¹ o desenho do implante tem influência direta sobre três parâmetros clínico-biológicos: (1) aumento da estabilidade primária e do torque de inserção; (2) adaptação a defeitos anatómicos e alvéolos pós-extração; (3) manutenção ou reabsorção da crista óssea marginal.¹

Assim, é possível afirmar que o desenho do implante é um fator importante a considerar, tal como o tipo de conexão ou o tipo de superfície do mesmo. Porém, parece existir uma falta de consenso relativamente ao melhor desenho de implantes.^{2,4}

Importa sublinhar que a escolha do implante é determinada pela disponibilidade óssea existente, pela qualidade do tecido ósseo e pelo local a que o Médico Dentista se propõe reabilitar.⁴

Atualmente, existem disponíveis várias formas de implantes, nomeadamente os implantes cilíndricos e os cónicos, que são o principal tema deste artigo.

Fig. 1. – Atualmente, o Médico Dentista tem ao seu dispor um leque variado de implantes com diferentes formas, com e sem espiras, com conexão interna ou externa ou cone-morse. (Nas imagens, da esquerda para a direita, implantes BISConic Biotech®, NobelBiocare®, Biomet 3i®, IDI®, Mis® Zimmer®, BTI®).

Implantes Cónicos

Inicialmente desenhados para casos de implantes pós-extração, os implantes cónicos assumem-se como uma opção vantajosa em procedimentos em que se verifica a existência de limitações anatómicas que condicionam o plano de tratamento 'ideal'.⁵ Zonas com concavidades vestibulares – como a região anterior da maxila, cuja possibilidade de fenestrações apicais é mais elevada – são regiões em que a utilização de implantes do tipo cónico é mais indicada, uma vez que este tipo de configuração permite a colocação do implante numa posição mais axial, diminuindo justamente a probabilidade de perfuração.⁵

A configuração apical – mais estreita – permite, segundo Shapoff (2002) evitar não só fenestrações na parede vestibular, mas também um posicionamento méso-distal mais próximo do ideal, evitando raízes curvas e próximas de dentes adjacentes.⁵ Este facto contribui ainda para a obtenção de uma maior estética e função relativamente à componente protética.

A estabilidade primária – fator chave para o prognóstico dos implantes – é um dos critérios mais importantes no âmbito da osteointegração, sendo fulcral quando se fala na colocação de implantes em carga imediata ou em casos de pós-extração.^{6,7} Segundo Garber, Salama e Salama (2001), os implantes de formato cónico contribuem para uma maior estabilidade primária devido à compressão a nível do osso cortical, nomeadamente em osso de baixa densidade (tipo IV).⁸ Também Rokn *et al.* (2010) atribuem uma maior estabilidade primária aos implantes cónicos, pelo facto de estes exercerem uma força compressiva lateral superior sobre as paredes ósseas durante a colocação do implante.⁹ Atendendo a outros parâmetros como o tamanho e diâmetro do implante, Barikani *et al.* concluíram, num estudo *in vitro* publicado em 2014¹⁰, que em situações em que a opção clínica recai sobre a utilização de implantes curtos, os de desenho cónico são recomendados, precisamente por apresentarem uma maior estabilidade primária. Esta conclusão abre uma nova perspetiva no que à forma dos implantes curtos diz respeito, atendendo ao que Petrie e Williams defendem no seu artigo de 2005, nomeadamente que os implantes curtos e cónicos

devem ser evitados, especialmente em osso de baixa densidade, dado o aumento de tensão que se verifica na crista óssea.^{10,11}

No entanto, o facto de esta estabilidade ser obtida através da porção cervical é uma desvantagem dos implantes cónicos, ao contrário do que acontece com os implantes com *design* cilíndrico, que usam precisamente a metade apical do osso perfurado para atingir estabilidade.¹²

Similarmente, o stress a nível ósseo é outro dos parâmetros referidos em grande parte dos artigos sobre o tema. Relativamente aos implantes de *design* cónico, existem alguns estudos cujos resultados apontam para uma diminuição do stress no osso cortical e trabecular, comparativamente aos implantes cilíndricos ou paralelos, como é o caso dos estudos conduzidos por Huja *et al.* (1998), Rieger *et al.* (1990), Morris *et al.* (2006) ou Huang *et al.* em 2007.¹³⁻¹⁶ Todavia, estão publicadas outras análises com resultados inversos, em que os autores preconizam a utilização de implantes cilíndricos ao invés dos de *design* cónico, por considerarem que estes últimos provocam maiores picos de tensão e forças compressivas.¹⁷⁻¹⁹

Apesar da ausência de resultados verdadeiramente conclusivos, os últimos estudos publicados mostram-se consensuais ao afirmar que os implantes cónicos apresentam vantagens em casos de baixa densidade óssea (onde se procura a maior compactação óssea possível com a mínima eliminação de osso), em protocolos de carga imediata ou precoce e em situações de defeitos anatómicos e alvéolos pós-extração, no sentido de obter o máximo de estabilidade primária.^{1,3,5,20}

Implantes cilíndricos

O *design* cilíndrico é uma alternativa existente no mercado e é recomendado por alguns autores para casos de osso compacto, de forma a evitar problemas de sobrecarga, isquémia e osteólise.^{21,22}

Para a colocação deste tipo de implantes, e comparativamente a implantes com um *design* cónico, o torque de inserção necessário é menor, conforme nos reportam O'Sullivan

Dr. Rui Monterroso

Médico dentista licenciado no ISCS- Norte
Prática privada de implantologia
Consultor científico BIOTECH-Implants.

Dra. Helena Melo

Médica dentista licenciada na FMDUP

(2000), Molly (2006) e Elias (2011).^{4,23,24} De acordo com Zonfrillo *et al.* (2014) a necessidade de aplicação de torques mais baixos é uma das vantagens dos implantes cilíndricos durante a fase de colocação, dado que o stress local a nível ósseo é menor.²²

Também a nível da concentração de tensões, quando sujeitos a cargas de igual intensidade, estudos mostram que nos implantes de configuração cilíndrica existe uma distribuição das tensões por todo o corpo do implante, ao passo que nos cónicos estas se concentram na porção mais apical.²⁴⁻²⁶

Assim, segundo Carvalho e Pellizzer (2011), para além de uma distribuição de tensões mais equilibrada, os implantes cilíndricos demonstram apresentar um menor risco de fratura face a forças laterais. Porém, segundo os mesmos autores, o facto de requerer uma boa modificação da sua superfície e apresentar uma interface sujeita a maiores forças de cisalhamento são duas desvantagens deste tipo de geometria.²⁷

Moon *et al.* (2010)²⁰ acrescentam ainda que os implantes cilíndricos apresentam valores de estabilidade primária significativamente superiores nos casos em que se realiza uma sobrepreparação do leito, ao passo que Garber, Salama e Salama (2001) consideram que uma das desvantagens dos implantes paralelos é a destruição de espiras ósseas quando os implantes são rodados além da profundidade do leito preparado.^{8,20}

Lemos *et al.* (2014)²⁸ concluem que o desenho cilíndrico dos implantes assume, atualmente, uma menor relevância no ramo da implantologia, sendo implantes que apresentam piores dissipações de tensões e valores de estabilidade primária menores, ainda que estas condições possam ser favorecidas pela associação de uma modificação da superfície do implante. Por outro lado, e apesar de menos estáveis no momento de inserção, os implantes cilíndricos mostram um ganho de estabilidade rápido, devido à formação precoce de tecido ósseo após o coágulo originado entre a parede do alvéolo e o implante.²⁸

Conclusão

O sucesso de reabilitações implantossuportadas está diretamente relacionado com o processo de osteointegração, sendo de grande relevância o conhecimento dos fatores biomecânicos que possam influenciar a interface osso-implante.

A estabilidade primária, conceito fundamental para o êxito da osteointegração, depende não só da densidade do osso e da técnica cirúrgica mas também da morfologia do implante. Nas últimas décadas surgiram diferentes desenhos de implantes cujo principal objetivo passa por favorecer a obtenção de uma boa estabilidade primária e consequentemente a manutenção do tecido ósseo circundante ao implante. Atualmente, duas das formas dominantes são a cilíndrica e a cónica, associadas à presença de espiras.

Os implantes cónicos estão indicados para casos de baixa densidade óssea, em protocolos de carga imediata ou precoce e em situações de defeitos anatómicos e alvéolos pós-extracionais, no sentido de obter a maior estabilidade primária possível.

Por outro lado, os implantes com design cilíndrico apesar de apresentarem piores dissipações de tensões e valores de estabilidade primária menores comparativamente aos implantes cónicos, mostram ser vantajosos em casos de osso

Fig. 2 – Implantes cónicos Biotech®.

Fig. 3 – De salientar a concavidade vestibular e a porção apical mais estreita. Neste caso foi colocado um implante do tipo cónico.⁵

Fig. 4 – Implantes cónicos (Biotech®).

Fig. 5 – Implante cilíndrico e cónico.⁴

Fig. 6 – Implante cilíndrico.

mais compacto, requerendo um torque de inserção mais baixo aquando da colocação do implante.

Apesar das vantagens e desvantagens demonstradas por cada um destes implantes, não há um firme consenso sobre

qual a geometria que demonstra melhores resultados biomecânicos e clínicos. ■

Referências Bibliográficas

Pedido de referências bibliográficas para editorial@jornaldentistry.pt

	Implantes cónicos	Implantes cilíndricos
Estabilidade primária	Maior estabilidade primária, principalmente em osso de baixa densidade. ^{8,9} Vantajosos em casos em que se realiza uma subpreparação do leito. ²⁰	Menor estabilidade no momento da inserção do implante. Mostram, contudo, um ganho de estabilidade num curto intervalo de tempo, segundo Akimoto <i>et al.</i> (1999). Valores de estabilidade primária significativamente superiores em casos em que se realiza uma sobrepreparação do leito. ²⁰
Distribuição de tensões	Distribuição na porção mais apical do implante. ²⁴⁻²⁶	Distribuição por todo o corpo do implante. ²⁴⁻²⁶
Torque de inserção		Torque de inserção menor.
Configuração	Menor risco de fenestrações apicais devido à possibilidade de colocação do implante numa posição mais axial, dada a sua conformação apical mais estreita	
Indicações	Mais vantajosos em casos de baixa densidade óssea, protocolos de carga imediata ou precoce e situações de defeitos anatómicos e alvéolos pós-extracionais. ^{1,3,5,20}	Indicados para osso com elevada densidade. ²²